



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

Mycofix® Plus 3.EG

Vorteile:

Mycofix® Plus 3.EG leistet den entscheidenden Beitrag zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Tiere bei im Futter enthaltenen Mykotoxinen (Aflatoxine, Trichothecene, Zearalenon, Fumonisine, Ochratoxin A und Ergotalkaloide).

- Die synergistische Mineralmischung beinhaltet Bentonit (dioktaedrischer Montmorillonit), der Aflatoxine im Verdauungstrakt sehr effektiv bindet und auf diese Weise unschädlich macht. Registriert unter der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1060/2013.
- Reduziert Leberschäden und Membranschäden im Darmtrakt, die durch Mykotoxine im Futter verursacht werden.
- Reduziert mykotoxinbezogene Fruchtbarkeitsprobleme

Dosierung:

Sauen: 1,5 – 3,5 kg/t Fertigfutter*

Ferkel und Jungsaugen: 1,5 – 3,5 kg/t Fertigfutter*

Mastschweine: 1,5 – 3,5 kg/t Fertigfutter

Milchkühe: 30 – 50 g/Kuh/Tag*

Elterntiere: 1,5 – 3,5 kg/t Fertigfutter*

* abhängig vom Verunreinigungsgrad

*Hinweis: In den ersten 2 Monaten ab Einsatzbeginn von **Mycofix® Plus 3.EG** höhere Dosierung (3.5 kg/t) einsetzen! Danach auf empfohlene Einsatzmenge einstellen (siehe oben)*

Haltbarkeit:

18 Monate ab Produktionsdatum

Lagerung:

Trocken lagern und direktes Sonnenlicht vermeiden

Verpackung:

25 kg Plastiksäcke in Karton

Verabreichung:

Mycofix® Plus 3.EG wird dem Futter während des Mischens zugesetzt.



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

Einsatzempfehlung von Mycofix[®] Plus 3.EG

Zuchtsauen

Normaldosierung:

2,0 kg Mycofix[®] Plus 3.EG pro Tonne fertigem Futter (88% TS)

Beim Auftreten von klinischen Symptomen (bei Sauen und Ferkeln -Umrauscherprobleme, Futteraufnahme Probleme, Vulva-Schwellungen, Spreizer, Schwanzspitzennekrosen, untergewichtige Ferkel usw. -) für die Zeit von mindestens 2 Monaten:

3,5 kg pro Tonne

Zur Prävention (Vorbeuge):

1,5 kg pro Tonne

Ferkelaufzucht

Normaldosierung:

2,0 kg pro Tonne

Bei Futteraufnahme Problemen:

2,5 – 3,0 kg pro Tonne

Mastschweine

Vormast:

1,5 – 2,0 kg pro Tonne

Mittel-/Endmast:

1,0 kg pro Tonne

Rinder/Pferde

Milchkühe: 35 – 60 g pro Kuh und Tag (bei TMR: 0,7-1,5 kg pro Tonne frischer Mischration)

Pferde: 35 – 60 g pro Pferd und Tag

Geflügel

Elterntiere / Legehennen: 2,0 kg pro Tonne Futter

Masthähnchen: 1,0 - 1,5 kg pro Tonne Futter

Anmerkung:

In speziellen Fällen ist es ratsam eine repräsentative Futterprobe zu ziehen und auf die wichtigsten Mykotoxine zu untersuchen, um danach den Einsatz von Mycofix[®] Plus 3.EG festzulegen.



HOFRA GmbH · 97996 Niederstetten-Adolzhausen

Einsatzempfehlungen von Mycofix[®] Plus 3.EG (MPL 3.EG)

Dosierung (kg pro Tonne) von **Mycofix[®] Plus 3.EG**
in **fertigen** Mischungen (Basis: 88% Trockensubstanz)

| Gehalte an Mykotoxinen in fertigen Mischungen | Zuchtsauen (tragend und säugend!) | Ferkel | Mastschwein Vormast (25/30 - 45/50 kg LG) | Mastschweine Mittel-/Endmast (45/50 kg - Mastende) |
|---|---|-----------------|--|---|
| | MPL 3.EG | MPL 3.EG | MPL 3.EG | MPL 3.EG |
| DON (mcg/kg) | | | | |
| < 100 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | 0,5 |
| 100 - 500 | 2,0 | 2,0 | 1,50 | 0,75 - 1,0 |
| 500 - 1.000 | 2,75 | 2,75 | 2,0 | 1,25 - 1,50 |
| > 1.000 | 3,50 | 3,50 | 2,75 - 3,25 | 2,0 - 2,50 |
| ZEN (mcg/kg) | | | | |
| < 20 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | 0,5 |
| 20 - 50 | 2,0 | 2,0 | 1,50 | 0,75 - 1,0 |
| 50 - 100 | 2,75 | 2,75 | 2,0 | 1,25 - 1,50 |
| >100 | 3,50 | 3,50 | 2,75 - 3,25 | 2,0 - 2,50 |